

NOTA INFORMATIVA STREPTOCOCCO A/SCARLATTINA

Il batterio dello Streptococco beta emolitico di gruppo A può causare una semplice tonsillite, caratterizzata da febbre elevata, mal di gola, tonsille ingrossate. Quando si associa una manifestazione cutanea (macchioline localizzate al volto, al tronco, al collo, alle ascelle e all'inguine) e la lingua assume un caratteristico colore rosso (aspetto a fragola), si parla di scarlattina.

Il contagio può diffondersi nelle collettività e avviene attraverso il contatto diretto con le goccioline di saliva emesse dai soggetti infetti attraverso la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando.

In caso di malattia streptococcica è possibile il rientro in collettività secondo le indicazioni fornite dal medico curante, in genere dopo almeno 24-48 ore dall'inizio di idoneo trattamento antibiotico.

È opportuno che i contatti di un caso di malattia streptococcica, come ad esempio familiari e compagni di classe, attuino una sorveglianza per 7 giorni dall'ultimo contatto e in caso di comparsa di sintomi si rivolgano al proprio medico per una tempestiva valutazione, eventuale effettuazione di tampone e prescrizione di terapia antibiotica.

Per quanto riguarda la scuola l'attività didattica può continuare regolarmente. Non sono necessarie disinfezioni straordinarie dell'ambiente, ma è sufficiente un'accurata pulizia e igienizzazione degli strumenti didattici comuni, delle superfici toccate di frequente e dei giocattoli, nonché l'assiduo ricambio d'aria nella classe.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito di ATS BG nella pagina web dedicata alla scarlattina – al link <https://www.ats-bg.it/web/guest/streptococco>