



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Cure Primarie  
UO Pediatria Territoriale

Data, 05/02/2025

Ai Responsabile del Scuola,  
Ai Personale Docente e non Docente  
Ai Genitori degli alunni  
Della Scuola LOI ...Classe/Sezione 4C.

Oggetto: segnalazione di un caso di malattia da streptococco di gruppo A (scarlattina, faringotonsillite) e raccomandazioni sanitarie.

Si è verificato di recente un caso di malattia da streptococco di gruppo A (SGA) in bambino/a che frequenta nella classe 4C della vostra Scuola.

La malattia da streptococco di gruppo A è una malattia di origine batterica caratterizzata da sintomi generali come febbre elevata, mal di testa, mal di gola e dalla possibile comparsa di macchioline cutanee rilevate della grandezza di una capocchia di spillo localizzate al volto ed al tronco e più fittamente al collo, alle ascelle e all'inguine, mentre la zona intorno alla bocca è in genere risparmiata (scarlattina). Possono essere presenti dolori addominali o vomito, le tonsille sono in genere ingrossate, rosse, ricoperte di materiale biancastro presente anche sulla lingua che scompare dopo alcuni giorni lasciando un caratteristico colore rosso (aspetto a fragola). In alcuni casi può complicarsi con l'insorgenza di danni a carico del cuore, dei reni, delle articolazioni e del sistema nervoso centrale.

Il contagio avviene attraverso il contatto diretto con le goccioline di saliva dei soggetti affetti. Il periodo di incubazione è in media di 2-5 giorni.

La principale misura preventiva per controllare le infezioni da SGA e le loro conseguenze consiste nella diagnosi e nell'ideoneo trattamento antibiotico prescritto dal Medico Curante. Pertanto in caso di presenta febbre o mal di gola è consigliato rivolgersi al medico/pediatra curante per le indicazioni del caso.

In caso di malattia da streptococco di gruppo A è necessario l'allontanamento dalla collettività per 48 ore dall'inizio del trattamento antibiotico

Cordiali saluti

La Pediatra Territoriale

Roksana Chakrokh