



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Dipartimento di Sanità Pubblica
UOC Igiene e Sanità Pubblica
SSU Prevenzione Malattie Infettive

Il Responsabile

**ai Genitori
al Personale scolastico**

Nella scuola si è verificato di recente un caso di **scarlattina / tonsillite streptococcica**.

L'infezione da streptococco si diffonde frequentemente nelle collettività e facilmente in maniera epidemica.

La scarlattina è una malattia di origine batterica caratterizzata da sintomi generali come febbre elevata, mal di testa, mal di gola e dalla comparsa di macchioline cutanee della grandezza di una capocchia di spillo localizzate al volto, al tronco e più fittamente al collo, alle ascelle e all'inguine, mentre la zona intorno alla bocca è in genere risparmiata. Possono essere presenti dolori addominali o vomito, le tonsille sono in genere ingrossate, rosse, ricoperte di materiale biancastro presente anche sulla lingua. Tale materiale scompare dopo alcuni giorni lasciando un caratteristico colore rosso (aspetto a fragola). La scarlattina se non è trattata adeguatamente può dare complicanze come la malattia reumatica, con danni al cuore o ai reni.

Fortunatamente la malattia è controllabile con l'uso di antibiotici che la rendono benigna e ne riducono la contagiosità già dopo 2 giorni di trattamento. La somministrazione di antibiotico va continuata per un congruo numero di giorni, concordato con il pediatra.

Il contagio avviene attraverso il contatto diretto con le goccioline di saliva dei soggetti affetti.

La tonsillite streptococcica è causata dallo stesso germe che causa la scarlattina e può dare le stesse complicanze della scarlattina. La tonsillite streptococcica è molto diffusa nella stagione invernale sia tra i bambini che tra gli adulti.

Si raccomanda che i bambini che lamentano mal di gola o presentano tumefazione delle linfoghiandole del collo, anche in assenza di febbre, siano sottoposti a visita di controllo dal Pediatra, a cui va portata in visione la presente lettera.

Sia in caso di scarlattina che di tonsillite da streptococco è necessario l'allontanamento dalla collettività per almeno 48 ore dall'inizio di idoneo trattamento antibiotico .

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al personale dell'Igiene e Sanità Pubblica, telefonando dalle ore 12 alle 13,30 al numero 0542 604923

Dr Roberto Rangoni