



COSA FARE A CASA PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA

- Ogni mattina misurare la febbre. Se il bambino ha la febbre deve rimanere a casa e se questa supera i 37,5° occorre avvisare il pediatra
- Avvisare la scuola in caso di assenza per motivi di salute
- Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; altri sintomi più comuni nella popolazione generale: brividi, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), (ECDC, 31 luglio 2020).

COSA FARE PER ENTRARE A SCUOLA

Cosa portare a scuola?

Gli alunni entreranno a scuola forniti di una mascherina chirurgica. Si raccomanda di portarne una di riserva, insieme ad una piccola confezione di gel disinfettante, un pacchetto di fazzoletti di carta, l'acqua, un temperino con il contenitore, qualche sacchetto con chiusura ermetica (come quelli per congelare il cibo). Non è possibile utilizzare materiale in comune, quindi è necessario verificare quotidianamente la borsa dello studente per assicurarsi che ci sia il necessario al normale svolgimento delle lezioni e scrivere il proprio nome sul materiale. Non si possono portare giochi da casa.

Gli orari sono gli stessi per tutti?

Seguire le indicazioni per entrare a scuola riguardo gli orari e il percorso da seguire.

Attenzione a non fare ritardo!

È necessario rispettare rigorosamente l'orario di entrata.

Anche l'uscita dovrà svolgersi ordinatamente, rispettando le indicazioni ed evitando gli assembramenti.

COSA SUCCEDE SE IL BAMBINO STA MALE

Se il bambino a scuola presenta la febbre superiore a 37,5° C, la scuola contatterà subito la famiglia e avviserà il responsabile del Dipartimento di Prevenzione. Il bambino aspetterà i suoi genitori in un'aula in compagnia di un adulto munito di mascherina.

In questo caso è necessario venire a prendere il bambino prima possibile muniti di mascherina chirurgica, rispettando le disposizioni di sicurezza ed avvisare subito il pediatra/medico di famiglia.

