



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

I. C. "G. Rodari"

Via Carducci, 2 - Vermezzo, 20071 - Vermezzo con Zelo (MI)

Tel: 029440960 E-mail: miic873005@istruzione.it miic873005@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 90015620157

Vermezzo con Zelo, 29/01/2026

Prot. vedi segnatura

ALLE FAMIGLIE E
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
DELLA SCUOLA PRIMARIA di
VERMEZZO CON ZELO

OGGETTO: CASI DI OSSIURIASI LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE

Al fine di rasserenare ed informare adeguatamente le famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria di Vermezzo con Zelo si rende noto che la presenza di ossiuri non evidenzia casi di epidemia infettiva.

Gli ossiuri sono organismi pluricellulari che vivono nel tratto digerente, nutrendosi di ciò che il soggetto mangia, e moltiplicandosi attraverso la produzione di uova che possono diffondersi anche su altri soggetti, sia per contatto diretto sia mettendo in bocca alimenti non puliti o le stesse mani sporche. Si tratta quindi di una parassitosi intestinale. Al fine di dare alle famiglie ulteriori informazioni sugli ossiuri, consentendo una corretta prevenzione, si rimanda all'allegato alla presente circolare. Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler garantire una attenzione puntuale e accurata al fine di evitare il diffondere di eventuali epidemie nella comunità scolastica di ossiuri al pari della profilassi per pediculosi. La responsabilità principale della prevenzione e trattamento dell'ossiuriasi è dei genitori dei bambini che frequentano una collettività. Non spetta ai genitori la diagnosi; è necessario rivolgersi al medico curante (pediatra) che darà tutte le indicazioni relative alla situazione specifica.

A livello scolastico è sufficiente un'attenta pulizia giornaliera di tutti i locali con un comune detergente e l'osservanza del rispetto delle ordinarie norme igieniche, quali il lavarsi le mani prima di consumare qualsiasi alimento, mantenere le unghie delle mani corte, scoraggiare l'abitudine di portare le mani, od oggetti alla bocca.

Il personale scolastico (docente e Ata) dovrà fornire supporto e vigilare affinché gli alunni provvedano ad un lavaggio appropriato delle mani quando si recano in bagno e durante la pausa pranzo.

Frequentando per molte ore uno spazio collettivo come la scuola, sarebbe opportuno che i genitori informassero l'Istituto Comprensivo nel caso il proprio figlio avesse gli ossiuri, affinché tutti siano in grado di porre maggiore attenzione ad eventuali manifestazioni.

Si ribadisce che gli ossiuri sono un'infezione gestibile con il contributo del pediatra di famiglia e che non è necessario l'allontanamento dalla scuola o da altra collettività.

Si allega alla presente un'informativa di Regione Lombardia, con le principali indicazioni riguardanti tale patologia.

Si ringrazia per la consueta collaborazione. Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ingenito Daniele
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da DANIELE INGENITO

OSSIURIASI

Cos'è

L'ossiuriasi è un'infestazione intestinale provocata da piccolissimi vermi, gli ossiuri, a forma di spillo.

Si manifesta con prurito nella zona anale, più raramente alla vulva, disturbi del sonno e irritabilità, ma spesso è asintomatica.

È diffusa in tutto il mondo, e frequentemente interessa i bambini in età scolare e prescolare. L'uomo è l'unico ospite; gli animali domestici non sono contagiati.

L'uomo ingerisce le uova: in un periodo di uno-due mesi la femmina adulta di ossiuro gravida raggiunge la zona perianale dove deposita le uova.

Come si trasmette

Le femmine di ossiuri gravide di norma muoiono dopo aver depositato le uova. Il periodo di contagiosità dura fino a che le femmine depongono le uova e le uova rimangono infettive negli ambienti chiusi.

Si trasmette principalmente per via oro-fecale: le uova sono trasportate attraverso le mani e le dita e attraverso oggetti contaminati (giocattoli, lenzuola, biancheria, copri sedili di WC).

Cosa occorre fare se si verifica un caso di malattia

La diagnosi viene effettuata ponendo del nastro adesivo trasparente nella zona perianale e successivamente ricercando al microscopio le uova di ossiuro (scotch test).

Un corretto comportamento di igiene personale previene dal contagio: lavare le mani prima di mangiare o di preparare il cibo, e dopo aver utilizzato i servizi igienici.

Nel caso in cui una persona sia infestata dagli ossiuri è necessario assumere la terapia specifica, secondo le indicazioni del curante; cambiare le lenzuola e quotidianamente la biancheria intima, lavando in lavatrice a 60°C.

Cosa non è necessario fare

Non è necessario l'allontanamento dalla scuola o da altra collettività.

