

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero della pubblica Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" – Via al Cornicione, 35 – 20083 Gaggiano
Tel. 02/9085187 – Fax 02/9085048 – MIIC874001 – C.F.90015630156
e-mail: segreteria@comprensivogaggiano.edu.it miic874001@istruzione9ne.it miic874001@pec.istruzione.it
sito web – <http://comprensivogaggiano.edu.it>

Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
IC L. Da Vinci
Alla DSGA
Al Sito Web – RE

OGGETTO: CIRCOLARE PERMANENTE - INFEZIONE DA OSSIURI, ASCARIDI E ALTRI PARASSITI INTESTINALI.

Nel quadro delle attività di prevenzione della salute a scuola si trasmette la presente circolare, corredata in calce da ALLEGATO INFORMATIVO, destinato al personale della scuola e alle famiglie, relativo ai casi di parassitosi intestinale (ossiuri, ascaridi, tenia, ecc.) che si possono manifestare nei bambini e nei ragazzi che frequentano la comunità scolastica.

Si precisa che nel caso di accertata infezione da parassitosi intestinale **non è necessario l'allontanamento dell'alunno dalla scuola** o dalla comunità durante il periodo di trattamento.

I collaboratori scolastici sono tenuti ad osservare le norme igieniche indispensabili perché questo fenomeno sia tenuto sotto controllo.

Gli insegnanti che vengano a conoscenza della possibile presenza di infezione, dopo averne dato informazione al Dirigente Scolastico, nel rispetto delle norme sulla privacy, informeranno le famiglie sulla necessità di controlli preventivi sui propri figli.

Di seguito alcune informazioni sul fenomeno OSSIURIASI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emily Florido
f.to digitalmente ai sensi del D.L. 82/2005

ALLEGATO INFORMATIVO –

PARASSITOSI INTESTINALI (ossiuri, ascaridi, ecc.)

CHE COSA SONO

Le infestazioni intestinali da vermi parassiti si manifestano con prurito alla zona anale, più raramente alla vulva, disturbi del sonno, malessere generale, irritabilità, ma spesso possono essere anche asintomatiche. Sono molto diffuse e frequentemente interessano i bambini in età scolare e prescolare.

COME SI DIFFONDONO

Si trasmettono principalmente per via oro-fecale: le uova sono trasportate attraverso le mani e le dita e attraverso oggetti contaminati (giocattoli, lenzuola, biancheria, copri sedili di WC).

Incubazione: dalle 2 alle 6 settimane.

COME SI CURANO

Nel caso in cui una persona sia infestata da parassiti intestinali, cosa accertabile attraverso l'analisi delle feci, è necessario assumere la terapia specifica, secondo le indicazioni del medico curante; cambiare le lenzuola e quotidianamente la biancheria intima, lavando tutto in lavatrice a 60°C. Non è necessario l'allontanamento dalla scuola o da altra collettività. Importante è esaminare e trattare tutti i membri di una famiglia o istituzione in cui si sia verificato un caso e trattare i contatti stretti e famigliari.

COSA DEVE FARE LA SCUOLA

Un corretto comportamento di igiene personale previene dal contagio: lavare le mani prima di mangiare o di preparare il cibo, e dopo aver utilizzato i servizi igienici. Nel caso di segnalazione di un numero significativo e ricorrente di casi, la scuola si attiverà sollecitamente presso le istituzioni sanitarie territoriali (ASL).

COSA DEVONO FARE I GENITORI

Attenersi alle indicazioni del Pediatra o del Medico curante. Informare la scuola dell'avvenuto contagio.

NON E'NECESSARIO L'ALLONTANAMENTO DA SCUOLA CONSIGLI E BUONE PRASSI:

Oltre ai farmaci, uno specifico regime igienico e di pulizia della casa o delle scuole può contribuire alla completa eliminazione delle uova di ossiuro.

Pertanto occorre:

- assicurarsi che la persona infetta si lavi accuratamente le mani con acqua calda e sapone, soprattutto prima dei pasti;
- invitare i componenti del gruppo familiare a fare la doccia e a cambiare la biancheria intima ogni mattina;
- pulire e tenere corte le unghie;
- evitare di mettere le mani in bocca;
- favorire il lavaggio delle mani, in particolare prima dei pasti, dopo l'utilizzo dei servizi igienici, dopo aver giocato in aree aperte, o con materiali didattici particolari (creta, argilla..) e aver fatto attività sportiva;

- usare acqua molto calda per lavare biancheria da letto, asciugamani, e abiti nell'abitazione interessata.
- asciugare il bucato a calore alto;
- non scuotere abiti e biancheria da letto per evitare che le uova di ossiuro si spargano nell'aria
- non permettere ai bambini di fare il bagno insieme per evitare la diffusione di uova di ossiuro nell'acqua del bagno;
- pulire accuratamente ogni superficie che possa essere stata infettata, compresi giocattoli, pavimenti, piani di lavoro e assi dei water;
- aspirare accuratamente le zone coperte da moquette.

E' necessario che nel prossimo immediato periodo, considerato il massimo tempo di incubazione della patologia di sei settimane, venga segnalata tempestivamente al proprio Medico di fiducia la comparsa di sintomatologia sospetta nei soggetti potenzialmente esposti al contagio per un approfondimento diagnostico ed eventuale trattamento.