

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Viale Tre Martiri , 89 - 45100 Rovigo

Tel 0425/ 393763 – Fax 0425/394708

PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it

INDICAZIONI COVID SCUOLA

Si comunicano le seguenti indicazioni di carattere generale per emergenza covid 19 scuole . Tutti i bambini con sintomatologia simil-covid , debbono essere inviati , previo consenso dei genitori , al pediatra che redigerà impegnativa per effettuazione di tampone rapido da effettuarsi al covid point , in alternativa il test va somministrato dal pediatra stesso , se dotato di idonea strumentazione . Il bambino resta in isolamento domiciliare , se riscontrato positivo al test rapido , in attesa della riconferma al test molecolare . Al riscontro di positività al test rapido , si avverte il dipartimento di prevenzione con mail al covid scuola indicando nome , cognome , data di nascita e recapito telefonico , nonché classe e scuola di frequenza del soggetto in esame . La scuola si attiva nell 'inviare l elenco dei contatti stretti scolastici e cioè dei compagni della stessa classe ed insegnanti venuti a contatto con il caso positivo, degli ATA e degli eventuali contatti sullo scuolabus . Il referente covid o il preside , tramite registro elettronico anticipa ai contatti stretti che resteranno in isolamento fino ad esito tampone e non frequenteranno la scuola in presenza . Il sisp programma i tamponi con l ' usca ed invia mail di conferma al referente covid o Preside (data e ora di effettuazione dei tamponi) . Il sisp darà indicazioni in merito ad eventuale quarantena dell' intera classe sulla base del riscontro di positività nei contatti stretti . Se la classe verrà posta in quarantena , per un periodo della durata di 10 giorni, dall 'ultimo contatto con il positivo , il preside darà indicazioni della durata della stessa, tramite il registro elettronico alla famiglie , con indicazioni sull' isolamento domiciliare , come da comunicazione scritta dell' asl , onde agevolare la coordinazione tra scuola e sisp e famiglie . Al termine dell' isolamento domiciliare, l' asl programmerà insieme all' usca , il tampone di fine isolamento per verificare la negatività dei contatti e comunicherà al Preside la data e ora di programmazione degli stessi . Il risultato del test, se antigenico rapido , verrà consegnato all' atto dell' effettuazione del test dal personale medico , se molecolare dovrà essere scaricato dal fascicolo elettronico personale o richiesto al proprio medico di base . Per la riammissione alla frequenza scolastica tutti i tests dei contatti stretti debbono risultare negativi e comunque la valutazione conclusiva pre-ammissione e' compito del dipartimento di prevenzione e verrà comunicata al Preside, dopo analisi epidemiologica . In attesa sia della comunicazione di programmazione dei tamponi sia del giudizio di riammissione a scuola , i contatti resteranno in isolamento domiciliare , rispettando le norme allegate alla presente comunicazione . Chi si rifiuta di eseguire il test , sia per il tracciamento dei contatti sia per il test finale di riammissione a scuola dovrà sottostare ad una quarantena di 14 giorni , dall 'ultimo contatto con positivo .

Allegato 5. Indicazioni per la gestione dei soggetti in isolamento domiciliare e/o quarantena

1. Il soggetto deve rimanere in una **stanza dedicata** e dotata di **buona ventilazione**, possibilmente con **bagno dedicato**, dormire da solo/a. Se disponibile un solo bagno, dopo l'uso pulire con prodotti a base di cloro attivo 0.5% oppure con alcool 70%.
2. **Escludere eventuale impianto di ricircolo aria.**
3. **Limitare al massimo i movimenti del soggetto negli spazi comuni della casa.** Assicurarsi che gli **spazi condivisi** (ad es. cucina, bagno) siano **ben ventilati** (es. tenere le finestre aperte). **In presenza di altre persone**, mantenere una distanza di almeno un metro e assolutamente **evitare ogni contatto diretto.**
4. **Evitare ogni possibile condivisione di oggetti.** Il soggetto deve utilizzare **lenzuola, asciugamani, salviette e stoviglie dedicati.** Lavarli con cura con normale detergente prima di permettere il riutilizzo da parte di altre persone.
5. Vi è il **divieto di spostamenti** o viaggio e l'**obbligo** di rimanere **raggiungibile per le attività di sorveglianza.**
6. Vi è il **divieto di ricevere visite** fino al termine del periodo di isolamento e/o quarantena se il soggetto è asintomatico, e comunque fino a guarigione clinica se sintomatico.
7. Il soggetto deve indossare il più possibile una **mascherina chirurgica** per contenere le secrezioni respiratorie. Se questa non dovesse essere tollerata, osservare le norme di **igiene respiratoria** (coprire naso e bocca usando fazzoletti quando starnutisce o tossisce, tossire nel gomito; eliminare i fazzoletti monouso in un doppio sacco impermeabile in una pattumiera chiusa con apertura a pedale; lavarsi immediatamente le mani).
8. Le **persone incaricate di assistere il soggetto dovrebbero essere in buona salute**, non affette da patologie croniche o che compromettono il sistema immunitario.
9. Le **persone che assistono il soggetto devono indossare mascherina chirurgica** monouso (che non deve essere toccata durante l'uso e deve essere cambiata se umida o danneggiata), da eliminare in un doppio sacco impermeabile posto in pattumiera chiusa con apertura a pedale, procedendo successivamente a lavaggio delle mani. Se possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dal soggetto.
10. I conviventi e le **persone che forniscono assistenza devono evitare ogni contatto diretto con il soggetto.** Se l'assistenza prevede contatto con secrezioni respiratorie, feci o urine è necessario l'utilizzo dei guanti monouso che devono essere poi eliminati con cura in un doppio sacco impermeabile in pattumiera chiusa con apertura a pedale, seguito dal lavaggio delle mani.
11. **Pulire e disinfettare almeno una volta al giorno le superfici** dei locali utilizzati dal soggetto con detergenti e successivamente con prodotti a base di cloro attivo 0.5% oppure con alcool 70%, con particolare attenzione alle superfici toccate di frequente. Indossare un camice monouso (o un grembiule dedicato) e guanti monouso; in caso di guanti domestici in gomma spessa riutilizzabili, questi devono essere puliti e disinfettati dopo l'uso.
12. **Non scuotere la biancheria** del soggetto, deporla in un sacco dedicato, separatamente da quella del resto della famiglia e lavarla in **lavatrice ad almeno 60°** per trenta minuti, usando comune detersivo. Utilizzare mascherina chirurgica e guanti durante queste procedure.
13. I **rifiuti** (guanti, mascherine, fazzoletti, ecc.) prodotti dal soggetto in isolamento o nell'attività di assistenza, devono essere **smaltiti in un doppio sacchetto di plastica chiuso e disposto in pattumiera chiusa.**
14. Sebbene al momento non esistano prove che dimostrino che animali come cani o gatti possano essere una fonte di infezione per l'uomo, a scopo puramente precauzionale, si suggerisce di limitare il contatto con gli animali.
15. **Lavarsi le mani** (con sapone e acqua, per almeno 40 secondi, o con soluzione idroalcolica):
 - dopo contatto col soggetto o il suo ambiente;
 - prima e dopo aver preparato il pasto, usato il bagno, soffiato il naso e comunque in relazione a contatti potenzialmente a rischio;
 - prima e dopo la vestizione/svestizione dei DPI (mascherina, guanti, ecc.).

Il SISP (o in alternativa MMG/PLS secondo l'organizzazione e in funzione dell'evoluzione epidemiologica) provvede a contattare telefonicamente, una volta al giorno, il soggetto in isolamento, il quale è anche invitato a misurare ed annotare la temperatura corporea due volte al giorno e a **contattare solo telefonicamente SISP/118 nel caso di comparsa o peggioramento di febbre o altri sintomi.**