



ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO COCEANI”

**Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano
33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco**

Cod. Fiscale 94071010303

tel 0432 675204 e-mail: udic826008@istruzione.it; udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

“PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA”

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare sangue (epatite B – epatite C – AIDS ecc), si danno le seguenti indicazioni:

- **è necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale);**
- **gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti, ecc.) devono essere preferibilmente personali e comunque, qualora si imbrattino di sangue, devono essere opportunamente disinfettati;**
- **il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi organici è una soluzione di cloro attivo allo 0,5% che si ottiene diluendo una parte di candeggina in nove parti di acqua.**

Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come di seguito indicato:

- **indossare guanti monouso;**
- **allontanare il liquido organico dalla superficie con carta assorbente;**
- **detergere la superficie con soluzione detergente;**
- **disinfettare con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata come detto sopra e lasciare agire per un tempo minimo di dieci minuti;**
- **sciacquare con acqua;**
- **allontanare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto apposito per la raccolta dei rifiuti sanitari;**
- **togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto contenente i rifiuti e smaltirlo;**
- **lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.**

N.B.: è necessario controllare la composizione del prodotto a base di ipoclorito di sodio a disposizione, ed assicurarsi che abbia una concentrazione di cloro attivo al 5/6%.”