

*DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Direttore ff: Dr. Salvatore Falcone*

Prot. n. 32786

Verona, 25 febbraio 2021

Ministero dell'Istruzione  
USR Veneto Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona  
c.a. Dott. Albino Barresi  
PEC: [uspvr@postacert.istruzione.it](mailto:uspvr@postacert.istruzione.it)

Oggetto: Campagna di vaccinazione anti Covid-19 per il personale docente e non docente delle scuole statali.

Facendo seguito alla nota prot. n 28546 del 18 febbraio u.s. pari oggetto si comunica che dal 1 marzo p.v. inizierà la vaccinazione del personale docente e non docente di tutte le scuole statali di ordine e grado, mediante il vaccino ChAdOx1-S (Astrazeneca).

Sarà possibile prenotare l'appuntamento per sede di vaccinazione e fascia oraria al seguente link:

**<https://serviziweb.aulss9.veneto.it/>**

Si fa presente sin da ora che le date nelle quali sarà possibile ricevere tale vaccino verranno progressivamente incrementate nel tempo, per permettere la vaccinazione a tutti gli aventi diritto.

È possibile accedere alla prenotazione unicamente utilizzando il proprio Codice Fiscale. Sarà inoltre necessario fornire un indirizzo e-mail valido allo scopo di ricevere conferma della corretta registrazione della prenotazione, la quale avrà in allegato foglio anamnesi (che andrà presentato al momento della vaccinazione già compilato e firmato, unitamente al proprio tesserino sanitario) e nota informativa sul vaccino.

Tale tipo di vaccino può essere somministrato ai soggetti tra i 18 ed i 65 anni di età che non sono affetti dalle gravi patologie riportate nella tabella allegata alla presente nota. Si invita a comunicare a questo Servizio l'eventuale appartenenza ad una delle categorie elencate in tabella mediante mail da inviare all'indirizzo [vaccinazioni.covid@aulss9.veneto.it](mailto:vaccinazioni.covid@aulss9.veneto.it), con oggetto: "Insegnante con condizione di rischio" riportando nel testo della mail i propri dati anagrafici, codice fiscale e numero di telefono, al fine di riprogrammare successivamente la somministrazione con diverso vaccino anti Covid-19.

In caso di dubbi si invita a contattare il proprio medico curante.

Si chiede cortesemente di diffondere tale informazione a tutti gli Istituti scolastici statali e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore ff della U.O.C.  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
*Dott. Salvatore Falcone*



*DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE*  
**U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
*Direttore ff: Dr. Salvatore Falcone*

**CATEGORIE di ESCLUSIONE per vaccino ChAdOx1-S (Astrazeneca)**

| Aree di patologia                                                                                                                             | Definizione                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malattie Respiratorie</b>                                                                                                                  | Fibrosi polmonare idiopatica; altre patologie che necessitino di ossigenoterapia                                                                                                                                                                             |
| <b>Malattie cardiocircolatorie</b>                                                                                                            | Scompenso cardiaco in classe avanzata (IV NYHA); pazienti post shock cardiogeno.                                                                                                                                                                             |
| Condizioni neurologiche e <b>disabilità</b> (fisica, sensoriale, <b>intellettiva</b> , psichica)                                              | Sclerosi laterale amiotrofica; sclerosi multipla; paralisi cerebrali <b>infantili</b> ; pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie <b>immunodepressive</b> e <b>conviventi</b> ; miastenia gravis; patologie neurologiche <b>disimmuni</b> .    |
| Diabete/altre endocrinopatie severe (quali morbo di Addison)                                                                                  | Soggetti over 18 con diabete giovanile, diabete di tipo 2 e necessitano di almeno 2 farmaci ipoglicemizzanti orali o che hanno sviluppato una vasculopatia periferica con indice di Fontaine maggiore o uguale a 3                                           |
| <b>Fibrosi cistica</b>                                                                                                                        | <b>Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base.</b>                                                                                                                           |
| Insufficienza renale/patologia renale                                                                                                         | Pazienti sottoposti a <b>dialisi</b> .                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Malattie autoimmuni - immunodeficienze primitive</b>                                                                                       | <b>Grave</b> compromissione polmonare o marcata immunodeficienza e conviventi; <b>immunodepressione</b> secondaria a trattamento terapeutico e conviventi.                                                                                                   |
| Malattia epatica                                                                                                                              | Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Malattie cerebrovascolari</b>                                                                                                              | <b>Evento ischemico-emorragico</b> cerebrale che <b>abbia compromesso</b> l'autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto. Persone che hanno subito uno "stroke" <b>nel 2020</b> e per gli anni precedenti con <b>rankin</b> maggiore o uguale a 3. |
| Patologia oncologica e emoglobinopatie                                                                                                        | Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci <b>immunosoppressivi</b> , mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure e conviventi. Genitori di pazienti sotto i 16 anni di età. Pazienti affetti da talassemia.                  |
| Sindrome <b>di Down</b>                                                                                                                       | Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente <b>presenza di cardiopatie congenite</b> sono <b>da ritenersi fragili</b> .                                                             |
| Trapianto di organo solido: in lista di attesa e sottoposti a trapianto emopoietico dopo 3 mesi dal trapianto ed entro 1 anno dalla procedura | Trapianto <b>di organo solido</b> o emopoietico al <b>di fuori</b> delle tempistiche specificate, che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica in terapia immunosoppressiva e conviventi.                                       |
| Grave obesità                                                                                                                                 | Pazienti con BMI maggiore di 35                                                                                                                                                                                                                              |